

# သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ရန် တစ်ဦးချင်းနှင့် ပြည်သူလူထုအုပ်စုများ အလိုက်ဆောင်ရွက်သင့်သည့်လုပ်ငန်းများ

သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကိုလူတစ်ဦးချင်းနှင့်ပြည်သူလူထုအုပ်စုများစုပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်နိုင်သည်။

အောက်ပါအဓိကျသည့်အချက်(၂)ချက်ကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ပါကတစ်ဦးချင်းသော်၎င်း၊ ပြည်သူများအနေနှင့်၎င်း ကာကွယ်ရန်နည်းလမ်း များကို ရှင်းလင်းပြောပြရန်မလိုဘဲ သိရှိနိုင်ပါသည်။

၁။ ခြင်ကောင်နေထိုင်နားခိုလေ့ရှိသည့်နေရာများနှင့်ပေါက်ပွားတတ်သည့်နေရာများ  
၂။ ခြင်ကောင်သည်နေ့အချိန်တွင်ကိုက်ပြီး လူတွင်သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကို ဖြစ်ပွားစေသည်။  
နေထိုင်သည့်နေရာ-အိမ်တွင်းနှင့်အိမ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အမှောင်ရိပ်ကျသောနေရာများတွင် နားသည်။  
နားခိုခြင်း - အိမ်အတွင်းရှိဘီခိုများ၊မှောင်သည့်အခန်းဒေါင့်များတွင်နားခိုလေ့ရှိသည်။  
ပေါက်ပွားခြင်း - မြို့ရွာများအတွင်းရှိအိမ်၊ကျောင်းနှင့် အခြားအဆောက်အဦများ၏ အတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ ရေသိုလှောင် သည့်နေရာများ ဥပမာ-ရေစည်၊ အိုး၊ ပုံး၊ ပန်းအိုး၊ ပန်းအိုးအောက်ခံပန်းကန်ပြားများ၊ ရေထည့်သည့်ပစ္စည်းများ၊ ရေတိုင်ကီများ၊ ဝီပါများ၊စွန့်ပစ်ထားသည့်ပုလင်းခွံပူးခွံများ၊ တာယာများ နှင့်အခြားမိုးရေတင်ကျန်နိုင်သည့်နေရာများ၊မိုးရေလှောင်ကန်များတွင်ခြင်မကဥအဖြစ် ပေါက်ပွား ပါသည်။သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားစေသည့် ခြင်ကောင်သည် ဖော်ပြပါနေရာ များမှလာသည်။

ခြင်ကိုက်ခြင်း - ခြင်သည်နေ့အချိန်တွင်ကိုက်ပြီး သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကိုကူးစက်ပြန့်ပွားစေသည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သောအန္တရာယ်ရှိသည့်အုပ်စုများ-သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါသည်ကလေးများကိုအဓိက အန္တရာယ်ပြုသည့်ရောဂါဖြစ်သော်လည်းလူကြီးများ (နိုင်ငံခြားသားများအပါအဝင်) လည်းအန္တရာယ် ရှိသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရောဂါဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည့်ရာသီ- မေလမှအောက်တိုဘာလအတွင်းအဓိကဖြစ်ပွားသည်။  
ကုသခြင်း - အတိအကျကုသသည့်ဆေးမရှိပါ။ လူနာအခြေအနေအားအထောက်အကူ ဖြစ်စေသည့် ကုသမှုမျိုးကိုသာပြုလုပ်နိုင်သည်။

## တစ်ဦးချင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည့်လုပ်ငန်းများ

- ခြေလက်များနှင့်ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကိုတတ်နိုင်သမျှလုံအောင်ဖုံးအုပ်ဝတ်ဆင်ပါ။
- နေ့အချိန်များတွင် ခြင်မကိုက်နိုင်သည့်လိမ်းဆေးများလိမ်းပါ။ ဆေးထုတ်လုပ်သူများ၏ ညွှန်ကြားချက်ကို အတိအကျလိုက်နာပါ။
- အိမ်အတွင်းတွင် ခြင်ဆေးခွေကိုအသုံးပြုပါ။
- သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားနေသူအားခြင်ထောင်ဖြင့်သိပ်ပါ။ရောဂါဖြစ်ပွားနေသူကိုကိုက်မိပါက ခြင်သို့ ရောဂါပိုးများကူးစက်သွားနိုင်ပါသည်။ခြင်ထောင်နှင့်ခြင်ဆေးခွေများအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရောဂါဖြစ်ပွား နေသူအားခြင်ကိုက်မိခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ပြီးအခြားသူများသို့ရောဂါဆက်လက်ကူးစက်ပြန့်ပွားခြင်းကိုကာ ကွယ်သည်။
- နေ့အချိန်တွင်အိပ်စက်သောသူတိုင်းခြင်ထောင်ဖြင့်အိပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ဥပမာ-မွေးကင်းစများ၊ ကလေးငယ်များနှင့်အသက်ကြီးသူများဖြစ်ပါသည်။

ပြည်သူ့လူထုများလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်သည့်လုပ်ငန်းများ

- ရေစည်ရေအိုးများကိုခြင်မဝင်နိုင်အောင်ဖုံးအုပ်ထားပါ(သို့)တစ်ပတ်တစ်ခါရေသွန်၍ အတွင်းဘက်ကို ပွတ်တိုက်ဆေးကြောပါ။အိမ်တွင်းနှင့်အိမ်ပြင်ပရှိစွန့်ပစ်ထားသောမိုးရေတင်ကျန်နိုင်သည့်ပစ္စည်းများဥပမာ -ပုလင်းခွံ၊ဖူးခွံ၊တာယာနှင့် ပလတ်စတစ် ခွက်များတို့ကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပါ။
- အလှစိုက်ပန်းအိုးများ၊ပန်းပင်စိုက်သည့်အိုးများ၊အောက်ခံပန်းကန်ပြားများနှင့်နတ်ပန်းအိုးများတို့ကိုတစ်ပတ်တစ်ခါရေမှန်မှန်လဲလှယ်၍ အတွင်းပိုင်းကိုပွတ်တိုက် ဆေးကြောပါ။
- အိမ်၊ကျောင်းနှင့်အခြားလူစုဝေးသည့်နေရာများအနီးရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုမိုးရေမတင်နိုင်အောင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ပါ။

Source: World Health Organization (Country Office for Myanmar)